

Aandachtspunten Afwijkend Mondgedrag

Aspecten die van belang zijn bij afwijkende mondgewoonten zoals duim-, vinger- en/of speenzuigen, open mondgedrag zoals (hab. mondademen), lage tongligging in rust en een afwijkend slikpatroon (protraal, lateraal) met als gevolg een afwijkende vorm (van het gebit) t.g.v. de afwijkende functie behoort tot de preventieve controle. De tandarts/mondhygiënist verwijst deze patiënten door naar een logopedist.

Conform de richtlijnen van de Werkgroep Kindertandheelkunde NMT 2011

CONTROLE OP VORM VERSUS FUNCTIE:

Constateren van een afwijkende vorm zoals

1. VOB (niet gerelateerd aan wisselfase of een skelettaal open beet)
2. Uni- of bilaterale open beet (niet skelettaal gerelateerd)
3. Uni- of bilaterale kruisbeet vaak i.c.m.
4. Gotisch gehemelte
5. Niet skelettaal gerelateerde SOB (pseudo klasse II)
6. Niet skelettaal gerelateerde omgekeerde beet (pseudo klasse III)
7. Ankylotisch frenulum linguale
8. Rugae palatinae sterk vergroot (tgv mondademen) zie vb. 4

Constateren afwijkend mondgedrag als

9. Persisterend duimzuigen, vingerzuigen of speenzuigen
10. Afwijkende slik (protraal, lateraal, interdentaal)
11. Mondademen (vaak i.c.m. hypotone lichaamshouding)
12. Faciale grimas (tijdens slik wijst op interdentaliteit)
13. Recidiverende Otitis Media tgv afwijkende slik

Constateren afwijkende (logopedische) articulatie als

14. Lispelen
15. Slissen



1



2



3



4



5



6



7



9



9



10



10



11



12



10